

Vejledende visitationsguide

Gravide med **kendt blodtryksproblematik**

(essentiell hypertension, gestationel hypertension eller præeklamsi)

Bliver fulgt i telemedicinsk regi

Patienten er informeret om at kontakte telemedicin (tlf. 23243110) ved behov
(telefon omstilles til 410, når den ikke er bemandet)
Ringer patienten til 346 kan følgende visitation anvendes

Diastolisk BT 90-99
og/eller
systolisk BT 140-149

Diastolisk BT ≥ 100
og/eller
systolisk BT ≥ 150

Ingen vedvarende
subjektive PE-
symptomer

Vedvarende
subjektive PE-
symptomer

Ingen vedvarende
subjektive PE-
symptomer

Afvente opkald fra
telemedicin

Tilses samme dag i 346

Individuelt – se
patientplannotat for
evt. aftale om pn.
behandling.
Ved tvivl: Konf. læge.

Følges ikke i telemedicinsk regi (ofte forløb i ambulans svangre 451)

Diastolisk BT ≥ 100
og/eller
systolisk BT ≥ 150

Diastolisk BT 90-99
og/eller
systolisk BT 140-149

Vedvarende
subjektive PE-
symptomer

Ingen vedvarende subjektive
PE-symptomer

Tilses samme dag 346

Tjek om pt. har opfølgning i
svangreambulatoriet 451 fx tilvækst og læge
eller tlf. tid. (ved tvivl konf. læge)

Opfølgning i 346 mhp. opstart/optimering af
behandling/evt. plan for pp.med.

Særlig opmærksomhed ved følgende subjektive PE-symptomer:

- Vedvarende hovedpine, vedvarende synsforstyrrelser, eklamsi
- Dyspnø, trykken for brystet
- Smerter i epigastriet/øvre abdomen, opkastninger